






ستاسې د زېرون کنټرول غوراوي

مهم ټکي



- ستاسې ډاکټر کولی شي تاسې سره دا پریکړه کولو کې مرسته وکړي چې ستاسې لپاره د زېرون کنټرول یا د بلارېډو مخنیوي کومه طریقه سمه ده.
- د زېرون کنټرول ځینې انتخابونه گولې، جراحي یا عملیات، او د ستنې تزریق دی.
- د دې میتودونو موده لنډمهاله، اوږدمهاله یا د تل لپاره کیدی شي.

ستاسې ډاکټر تاسې نه پوښتنه کوي چې آیا تاسې بلارې یې یا غواړئ چې بلارې شئ. که تاسې غواړئ چې بلارې نشئ، نو ستاسې ډاکټر به ستاسې د ملاقات پرمهال تاسې سره د زېرون کنټرول یا د کورنۍ پلان کولو په اړه وغږيږي.

دا پوښتنې محرم او پټې دي. محرم پدې معنی چې ستاسې ډاکټر او ژباړونکی به ستاسې ځوابونه د کوم بل چا سره شریک نکړي. یوازې هغه ډاکټران او نرسان به ستاسې طبي مخینې ته لاسرسی ولري چې ستاسې پاملرنه کوي.

میتود	څنگه یې وکاروئ	گټې	تاوانونه
	ډاکټر ټیوبونه پرې کوي/بلاک کوي	د تل لپاره دوام کوي. خورا ډیر اغیز لرونکی	بیرته نه بدلېږي. د ایچ.آی.وي/ایس.ټي.آی. ایس پروړاندې محافظت نه کوي.
	ډاکټر ټیوبونه پرې کوي/بلاک کوي	د تل لپاره دوام کوي. خورا ډیر اغیز لرونکی	بیرته نه بدلېږي. د ایچ.آی.وي/ایس.ټي.آی. ایس پروړاندې محافظت نه کوي.
	ډاکټر ستاسې پوټکي لاندې پلاستيکي راډ ږدي	دا د 3 کلونو لپاره کار کوي. ډیر فعال	غیرمنظم وینه بهیدل. د ایچ.آی.وي/ایس.ټي.آی. ایس پروړاندې محافظت نه کوي.
	IUD د ډاکټر په واسطه په رحم کې ایښودل کېږي	د 5 کلونو (میرینا) یا 3 کلونو (لیلیټا) لپاره کار کوي. ډیر فعال	غیرمنظم وینه بهیدل یا ټاکي یا هیڅ وینه نه بهیدل. د ایچ.آی.وي/ایس.ټي.آی. ایس پروړاندې محافظت نه کوي.
	IUD د ډاکټر په واسطه په رحم کې ایښودل کېږي	د 10 کلونو لپاره کار کوي. ډیر اغیزناک دی. هیڅ هورمون نلري. ماشوم ته د ټي شیدو ورکولو کې ستونزه نه رامینځته کوي	درنده وینه بهیدنه، ناوړه تنگوالی. د ایچ.آی.وي/ایس.ټي.آی. ایس پروړاندې محافظت نه کوي.

<p>غيرمنظم وينه بهيدنه يا ٽاڪي. د بشيرازوالي بيرته راستنيدو لپاره تر يو ڪال پوري وخت نيولي شي. د ايڇ.آي.وي/ايس.ٽي.آي.ايس پروپراندي محافظت نه ڪوي.</p>	<p>لڙي مياشتي ناروغي يا هيڃ مياشتي ناروغي نه درلودل. ماشوم ته د تي شيدو وركولو ڪي ستونزه نه رامينخته ڪوي</p>	<p>په هرو 3 مياشتو ڪي تزريق</p>	<p>ستنه - ڊيو پروورا</p>	
<p>د زره بدي، وزن ڊيريديو، سردرد، او جنسي ليوالي ٽيا ڪي د بدلون لامل ڪيدي شي. د ايس.ٽي.آي پروپراندي محافظت نه ڪوي.</p>	<p>مياشتي ناروغي ڊيره منظم او درد پي ڪمولى شي. دانې او د مياشتي ناروغي علاڃي ٻني ڪوي.</p>	<p>بايد په ورته وخت ڪي هره ورڃ وڃورل شي</p>	<p>گولي</p>	
<p>د زره بدي، وزن ڊيريديو، سردرد، جنسي ليوالي ٽيا ڪي د بدلون لامل ڪيدي شي. د ايڇ.آي.وي/ايس.ٽي.آي.ايس پروپراندي محافظت نه ڪوي.</p>	<p>مياشتي ناروغي منظم ڪولى شي، درد پي ڪمولى، دانې او د مياشتي ناروغي علاڃي محدودوي.</p>	<p>بايد په ورته وخت ڪي هره ورڃ وڃورل شي</p>	<p>د يوازي پروڙستين لرونڪي گولي</p>	
<p>ممکن پوتڪي ڪي سوزش پيدا ڪري. د 1-2 مياشتو لپاره ٽاڪي او نڀي. د ايڇ.آي.وي/ايس.ٽي.آي.ايس پروپراندي محافظت نه ڪوي.</p>	<p>مياشتي ناروغي ڊيره منظم او درد پي ڪمولى شي. هره ورڃ گولي خورلو ته ارتيا نشته.</p>	<p>په اونى ڪي يوڃل په پوتڪي نوى بيچ ڪارول ڪيري.</p>	<p>بيچ</p>	
<p>ممکن د مهبل وتونڪي مايعات ڊير ڪري. د 1-2 مياشتو لپاره ٽاڪي او نڀي. د ايڇ.آي.وي/ايس.ٽي.آي.ايس پروپراندي محافظت نه ڪوي.</p>	<p>مياشتي ناروغي ڊيره منظم او درد پي ڪمولى شي. هره ورڃ گولي خورلو ته ارتيا نشته.</p>	<p>کوچنى پلاستيڪي ڪري مهبل ڪي اينڊول ڪيري. هره مياشت ڪري بدليري.</p>	<p>ڪري</p>	
<p>هرڃل ڇي جنسي عمل ڪوي بايد وڪارول شي. د ايڇ.آي.وي/ايس.ٽي.آي.ايس ڪي مرسته نه ڪوي.</p>	<p>ڪارول پي اسانه دي. هيڃ هورمون نلري. اوردي مودي لپاره ڪار ڪوي، بياڃل ڪارول ڪيدي شي.</p>	<p>هرڃل ڇي تاسي جنسي عمل ڪوي صحيح پي دننه ڪري.</p>	<p>ڊيافراگم</p>	
<p>د اغزمئنتيا لپاره بايد هرڃل جنسي عمل پرمهال وڪارول شي.</p>	<p><u>دا يوازي ميتود دي ڇي د ايڇ.آي.وي</u> <u>او د جنسي عمل له لاري انتقاليدونڪي</u> <u>عقونيتونو مڃيوي ڪي مرسته ڪوي</u></p>	<p>هرڃل ڇي جنسي عمل ڪوي نوى ڪانڊوم وڪاروي.</p>	<p>ڪانڊوم (نارينه او بڻڃينه)</p>	
<p>د بلاڊتوب پيرني مڃيوي</p>				

<p>که د ډاکټر لخواه پي نسخه نه وي ورکړل شوي او د بيبي پوښښ لاندې نه وي نو کيدی شي گرانې او قيمت وي. د ايج.آي.وي/ايس.تي.آي.ايس پروباندي محافظت نه کوي.</p>	<p>دا په ډيری درملتونونو کې د ډاکټر نسخې يا آي.ډي پرته شتون لري (د فارميسيست نه پي غوښتنه وکړئ)</p>	<p>دا گولی بايد د غيرخوندي جنسي عمل په 3 ورځو کې وخوړل شي. دا د غيرخوندي جنسي عمل تر 5 ورځو پورې خوړل کيدی شي. دا 1 يا 2 گولی پي (2 گولی پي دواړه بايد يوځای وخوړل شي).</p>	<p>د بلاريتوب بيرني مخنيوي گولی (ECP) (پلان پي)</p>	
<p>د دننه ايښودلو لپاره طبي مسلکي فرد ته اړتيا ده. د ايج.آي.وي/ايس.تي.آي.ايس پروباندي محافظت نه کوي.</p>	<p>د منظم زيرون کنټرول وسيلې په توگه ورته دوام ورکول کيدی شي</p>	<p>د لومړي غيرخوندي جنسي عمل په 5 ورځو کې دننه کيدی شي.</p>	<p>مس - لرونکی IUD (Cu-IUD) (بيرني IUD)</p>	

سرچينه: <https://www.cdc.gov/reproductivehealth/contraception/mmwr/spr/intro.html>