


ໂຣຄ໌ "ແອນແທຣດ" (ໂຣຄ໌ຕິດຮ້າຍແຮງໃນສັດລ້ຽງ)

ໂຣຄ໌ "ແອນແທຣດ" ແມ່ນຫຍັງ?

ໂຣຄ໌ "ແອນແທຣດ" ເປັນໂຣຄ໌ທີ່ເກີດມາຈາກ "ແບກທີເຣັຽ" ຊະນິດນຶ່ງ. ໂຣຄ໌ນີ້ຈະທຳໃຫ້ທ່ານປ່ວງໄຂ້ໄດ້ຫລາຍແບບ ແລ້ວແຕ່ທ່ານ ຕິດພະຍາດ



ເຊື້ອໂຣຄ໌ແອນແທຣດ

ນາໃນແບບໃດ. ມັນອາດຈະມາເປັນແບບທີ່ເປັນແຜຕາມສິວໝັ້ງ ຫລືແບບຖ່າຍທ້ອງຢ່າງແຮງ ຄ້າຍຄືໃນເວລາເບື້ອອາຫານ. ອີກແບບນຶ່ງກໍຄືທາງລະບົບຫາຍໃຈ ເພາະການຫາຍໃຈເອົາເຊື້ອໂຣຄ໌ເຂົ້າທາງການຫາຍໃຈ. ຕາມທັມດາແລ້ວ

ອາການຈະປະກົດໃຫ້ເຫັນພາຍໃນ 7 ວັນ (ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນ ລະຫວ່າງ 2 ສອງ ຫາ 5 ວັນ) ຫລັງຈາກທ່ານຕິດພະຍາດນາ. ອາການຈະຂະຫຍາຍໄປຫລາຍແບບ ແລ້ວ ແຕ່ພະຍາດ:

- **ພະຍາດ "ແອນແທຣດ" ຕາມສິວໝັ້ງ** ຈະເລີ່ມດ້ວຽ ສິວໝັ້ງໂນ ຂຶ້ນມາ. ພາຍໃນນຶ່ງຫາສອງວັນ ບ່ອນທີ່ໂນນັ້ນ ກໍຈະໂພງຂຶ້ນ ເປັນຕຸ່ມ ມີນ້ຳໜອງ ແລ້ວກາຍເປັນແຜ ມີໝອງແຕ່ບໍ່ເຈັບ ທັງກາງນັ້ນຈະເປັນສີດຳ. ພິກນ້ຳເຫລືອງຢູ່ໄກ່ບ່ອນປາກບາດນັ້ນ ຈະໂພງຂຶ້ນ. ພະຍາດ "ແອນແທຣດ" ທີ່ສິວໝັ້ງນີ້ຢືນປົວໄດ້ງ່າຍ ໂດຍໄຊ້ຢາຕ້ານເຊື້ອໂຣຄ໌.
- **ພະຍາດ "ແອນແທຣດ" ໃນລຳໂສ້** ບໍ່ຄ່ອຍມີເລື້ອຽປານໃດ. ມັນຈະເລີ່ມຈາກການເປັນວິນຫົວ, ບໍ່ຢາກກິນເຂົ້າ, ຮາກ ແລະ ຖືຄິງໄຂ້. ອາການເຫລົ່ານີ້ ຕໍ່ມາຈະມີ ການເຈັບທ້ອງ, ຮາກອອກ ເລືອດ, ແລະຖ່າຍທ້ອງຢ່າງແຮງ. ຖ້າເປັນພະຍາດ "ອັນທຣັກ" ໃນລຳໂສ້ນັ້ນ, ສຳຄັນທີ່ທ່ານຈະຕ້ອງໄປຮັບການປິ່ນປົວໂດຍໄຊ້ ຢາຕ້ານເຊື້ອໂຣຄ໌ແຕ່ຫົວທີ.
- **ພະຍາດ "ແອນແທຣດ" ທາງລະບົບຫາຍໃຈ** ຈະເລີ່ມດ້ວຍອາການຄືກັນກັບຕອນເປັນໂຂ້ຫວັດໃຫຍ່ (ໂອ, ຖືຄິງ, ປວດກ້າມເນື້ອ). ອາການເຫລົ່ານີ້ຈະເປັນຢູ່ ສອງຫາສາມວັນ, ແລ້ວຈະຫາຍໄປ ວັນນຶ່ງຫລືສອງວັນ. ຕໍ່ມາບາງເທື່ອ ອາການ ເຈັບກໍຈະຄືນມາອີກ, ໃນແບບເຈັບປອດ, ຫາຍໃຈຟືດ, ແລະຕົກໃຈ ເປັນລົມ. ຖ້າຫາກບໍ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ, ພະຍາດ "ແອນແທຣດ" ທາງລະບົບຫາຍໃຈ ອາດເປັນອັນຕະຣາຍ ຄືເຖິງແກ່ຄວາມຕາຍ 90 ເປີເຊັນຂອງ 100 ເປີເຊັນຂອງຜູ້ທີ່ຕິດພະຍາດ. ຍ້ອນວ່າມີ ການປິ່ນປົວ, ພະຍາດ "ແອນແທຣດ" ທີ່ລະບາດໃນປີ 2001 ນັ້ນມີອັດຕາເສຍຊີວິດຢູ່ປະມານ 40 ເປີເຊັນ.

ຕິດໂຣຄ໌ "ແອນແທຣດ" ໄດ້ຢ່າງໃດ?

ຕອນນັ້ນຢູ່ນອກຮ່າງກາຍຄົນ ແມ່ພະຍາດ "ແອນແທຣດ" ຈະເປັນກ້ອນແຂງ ທີ່ເອີ້ນວ່າ "ສະປີ". ຕອນນັ້ນ ແມ່ພະຍາດ "ແອນແທຣດ" ນີ້ຂ້າໄດ້ຍາກ. ກ້ອນ "ສະປີ" ນັ້ນ ຢູ່ຕາມທັມຊາດໃນຜິ່ນດິນ

ແລະຈະມີຊີວິດຢູ່ໄດ້ຫລາຍປີ. ສັດຕ່າງໆ ເຊັ່ນງົວຄວາຍ, ແກະ, ນ້ຳ ແລະແບ້ ກໍສາມາດຕິດ ແມ່ພະຍາດໄດ້ ຖ້າມາເລືອຍູ່ຕາມດິນ ເປັນເວລານານ.

ສ່ວນຄົນຈະຕິດແມ່ພະຍາດ "ແອນແທຣດ" ໄດ້ ຖ້າມາເກື້ອກ້ວຍຢູ່ກັບ ສັດທີ່ຕິດແມ່ພະຍາດມາແລ້ວ, ຫລືຖ້າໄປຈັບບາຍຂົນສັດ ຫລື ຜົນຜະລິດ ອື່ນໆຂອງສັດທີ່ຕິດພະຍາດມາ, ຫລື ກິນຊີ້ນສັດທີ່ມີເຊື້ອພະຍາດ. ການຕິດພະຍາດ "ແອນແທຣດ" ໂດຍທັມຊາດ ຢູ່ໃນສະຫະຣັຖອາເມຣິກາ ນັ້ນຈະມີນ້ອຍທີ່ສຸດ.

ຕອນພະຍາດ "ອັນທຣັກ" ລະບາດໃນປີ 2001 ນັ້ນ ຄົນທັງຫລາຍ ຕິດເຊື້ອ "ແອນແທຣດ" ທາງຮູຂົນແລະທາງສິວໝັ້ງ ຍ້ອນວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ ຈັບເຄື່ອງຟາກທາງໄປສະນີທີ່ປະເມີນພະຍາດແລ້ວ. ບາງຄົນກໍເປັນຫວ່າງວ່າ ເຊື້ອພະຍາດນີ້ ອາດຖືກປ່ອຍອອກໄປຕາມອາກາດ ຢູ່ບ່ອນທີ່ມີຊຸມຊົນຢູ່. ການກະທຳເຊັ່ນນັ້ນກໍຈະທຳໃຫ້ຄົນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍຕິດພະຍາດ "ແອນແທຣດ" ທາງການຫາຍໃຈໄດ້.

ທ່ານຈະຕິດໂຣຄ໌ຈາກບຸກຄົນຜູ້ອື່ນໄດ້ບໍ່?

ບໍ່ໄດ້! ທ່ານຕິດໄດ້ ຈາກການຫາຍໃຈເອົາ "ສະປີ", ຫຼືກິນຊີ້ນທີ່ມີ ພະຍາດຕິດຢູ່ ຫລືປ່ອຍໃຫ້ "ສະປີ" ເຂົ້າມາຖືກກັບສິວໝັ້ງຂອງທ່ານ ເທົ່ານັ້ນ. ຄົນທີ່ເປັນພະຍາດ "ແອນແທຣດ" ແລ້ວຈະບໍ່ສາມາດ ແຜ່ລະບາດ ໂຣຄ໌ໃຫ້ຜູ້ອື່ນຕິດນຳໄດ້.

ເປັນຫຍັງ ຈຶ່ງຄິດວ່າພະຍາດນີ້ຈະຖືກເອົາໄປໃຊ້ເປັນອາວຸດ ເພື່ອ ທຳການກໍ່ການຮ້າຍໄດ້?

ພະຍາດ "ແອນແທຣດ" ເຄີຍຖືກໃຊ້ເປັນອາວຸດມາກ່ອນ, ຕອນມີການລອບ ທຳຮ້າຍກັນ ໃນເດືອນ ອີກໂຕເປີ, ປີ 2001 ຕອນນັ້ນ ຄົນຮ້າຍໄດ້ເອົາ ພະຍາດຕິດໃສ່ໃນເຄື່ອງສົ່ງຜ່ານທາງໄປສະນີໂດຍການຫວ່ານເຊື້ອໂຣຄ໌ "ແອນແທຣດ". ໃສ່ສິ່ງຂອງນັ້ນ, ມີຄົນຊາວສອງຄົນໄດ້ຕິດເຊື້ອໂຣຄ໌ "ແອນແທຣດ" ຫ້າຄົນໃນຈຳນວນນັ້ນໄດ້ເສຍຊີວິດຍ້ອນ.

ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນອີກວ່າ ທັງອາເມຣິກາ ແລະທັງໂຊຫວຽດກໍເຄີຍໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ ການໃຊ້ເຊື້ອໂຣຄ໌ "ແອນແທຣດ" ນີ້ເປັນອາວຸດ. ເປັນທີ່ຄາດຄະເນໄດ້ວ່າ ປະຈຸບັນນີ້ ປະເທດອື່ນໆອີກຍັງອາດຈະພະຍາຍາມຕິດຕາມເບິ່ງເຮືອງນີ້ຕໍ່ ໄປອີກຢູ່.

ພະຍາດ "ແອນແທຣດ" ມີລັກຊະນະຫລາຍຢ່າງ ທີ່ສູນກາງຄວບຄຸມແລະ ບ້ອງກັນການຕິດຕໍ່ໂຣຄ໌ "ຢູແອສ ຊີ.ດີ.ຊີ" (CDC) ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າວ່າມັນ ຈະເປັນອາວຸດຊະນິດນຶ່ງໄດ້ໃນການກໍ່ການຮ້າຍ ທາງດ້ານ ຊີວະວິທະຍາ, ຄືວ່າ:



Communications Office
625 Robert Street/Box 64975
St. Paul, MN 55164-0975
(651) 201-4989
www.health.state.mn.us

ໂຮຄ໌ "ແອນແທຣດ" (ໂຮຄ໌ຕິດຮ້າຍແຮງໃນສັດລ້ຽງ) – ໜ້າ 2

- ເຖິງແມ່ນວ່າຈະບໍ່ຕິດລະບາດລະຫວ່າງຄົນກໍ່ດີ, ພະຍາດນັ້ນແຜ່ຂຫຍາຍໄປໄດ້ງ່າຍ
- ພະຍາດນັ້ນມີຜົນສະທ້ອນແກ່ສຸຂະພາບຂອງຄົນເປັນຢ່າງແຮງ, ພ້ອມທັງຈະທຳໃຫ້ຄົນເຈັບຕາຍໃນອັດຕາສູງໄດ້
- ພະຍາດນັ້ນ ພາໃຫ້ມີການເກີດການຫວັ່ນວິຕົກຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງ ພ້ອມທັງສ້າງຄວາມວຸ່ນວາຍຕໍ່ການສັງຄົມອີກ
- ຈຳເປັນຕ້ອງພິຈາລະນາຢ່າງຮອບຄອບໃນການຕຽມຮັບການລະບາດພະຍາດນີ້ ໃນເວລາມັນລະເບີດຂຶ້ນມາ

"ແອນແທຣດ" ຍິ່ນປົວໄດ້ບໍ່?

ພະຍາດ "ແອນແທຣດ" ຫາກແບບປິ່ນປົວໄດ້ໂດຍໃຊ້ຢາຕ້ານເຊື້ອ. ສຳຄັນທີ່ຕ້ອງເລິ່ມການປິ່ນປົວໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້. ບາງເທື່ອກໍ່ອາດຈະຊ່ວຍຕ້ານທານພະຍາດນີ້ໄດ້ ຖ້າຜູ້ທີ່ຕິດພະຍາດນັ້ນ ຫາກ ເລິ່ມໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຢ່າງໄວທັນເວລາ.

"ແອນແທຣດ" ປ້ອງກັນໄດ້ບໍ່?

ການປິ່ນປົວພະຍາດແຕ່ຫົວທີ່ ໂດຍໃຊ້ຢາຕ້ານເຊື້ອໂຮກ, ສຳລັບຄົນທີ່ຕິດພະຍາດນັ້ນມາແລ້ວ ເປັນວິທີທີ່ຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນໂຮກລ້ຽງທີ່ຕິດທີ່ສຸດ.

ຍັງມີຢາສັກ "ວັກຊີນ" ຕ້ານເຊື້ອ "ແອນແທຣດ" ທີ່ເຄີຍສັກໃຫ້ທະຫານນັ້ນໄດ້ຜົນດີ. ຈະຕ້ອງສັກຫຼືເຂັມເພື່ອປ້ອງກັນໂຮກ ແລ້ວແຕ່ລະປີຕ້ອງສັກເພີ່ມອີກ. ແຕ່ວ່າຢາສັກແບບນີ້ມີຈຳນວນໜ້ອຍ ບໍ່ມີພຽງພໍກັນເທື່ອໃຫ້ທ່ານໝໍຝ່າຍພົນລະເຮືອນໄຊ. ຢາສັກນີ້ກໍ່ເໝືອນຢາສັກອື່ນໆ ທີ່ອາດຈະມີອາການຂ້າງຄຽງບາງຢ່າງ. ປະຈຸບັນຍັງບໍ່ທັນຮູ້ໄດ້ແນ່ວ່າຢາທີ່ຜະລິດຕຽມໄວ້ນັ້ນມີຈຳນວນໜ້ອຍຫຼາຍພຽງໃດຖ້າເກີດມີຄວາມຕ້ອງການຂຶ້ນມາ, ແລະຈະໄປເອົາໄດ້ຢູ່ໃສ ຖ້າຫາກເກີດມີເຫດການເກີດຂຶ້ນມາ. ຍ້ອນເຫດຜົນເຫລົ່ານີ້ ການສັກຢາໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທົ່ວໄປ ປະຈຸບັນນີ້ຈຶ່ງບໍ່ຖືກແນະນຳເອົາມາໄຊ້.

ຄວນໃຊ້ຢາຕ້ານເຊື້ອໂຮກອື່ນໆປ້ອງກັນໄດ້ບໍ່?

ບໍ່ຄວນ! ການເອົາຢາຕ້ານເຊື້ອໂຮກມາສັກປ້ອງກັນໄວ້ກ່ອນ ອາດເປັນອັນຕະລາຍ. ຢາຕ້ານເຊື້ອໂຮກເຫຼົ່ານັ້ນອາດມີຜົນແລະມີຜົນ ສະທ້ອນຂ້າງຄຽງຢ່າງອື່ນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ, ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ຖືພາ, ເດັກນ້ອຍ, ແລະຜູ້ທີ່ມີອາການແພ້ຢາຕ້ານເຊື້ອໂຮກນັ້ນ. ນອກນັ້ນການໃຊ້ຢາຕ້ານເຊື້ອໂຮກຫຼາຍເກີນສ່ວນກໍ່ຈະເປັນການປູກແມ່ພະຍາດໃຫ້ແຮງຂຶ້ນຈົນບໍ່ສາມາດຈະໃຊ້ຢາຕ້ານເຊື້ອໂຮກອື່ນໆມາຂ້າມັນໄດ້.

ສຳນັກງານສາທາລະນະສຸຂ, ໂຮງພະຍາບານ, ແລະສະຖານຮັກສາພະຍາບານທົ່ວຮູ້ຖືມິນີໂຊຕາ ຕຽມພ້ອມຢູ່ຕອດເວລາເພື່ອຕິດຕາມເບິ່ງການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຜິດປົກກະຕິຕ່າງໆຂອງເຊື້ອໂຮກ ພ້ອມທັງການທີ່ຄິດວ່າຈະລອບໂຈມຕີທີ່ໃຊ້ແມ່ພະຍາດ "ແອນແທຣດ" ເປັນເຄື່ອງມື. ຖ້າຫາກສືບຮູ້ວ່າມີແຜ່ນໃຊ້ແມ່ພະຍາດ "ແອນແທຣດ" ໃຫ້ກໍ່ລະບາດຂຶ້ນ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸຂ ຮູ້ຖືມິນີໂຊຕາ ແລະ ໜ່ວຍງານສາທາລະນະສຸຂ ແຕ່ລະທ້ອງທີ່ ກໍ່ຈະມີການດຳເນີນງານຢ່າງທັນທີ. ໜ່ວຍງານເຫລົ່ານັ້ນຈະຕ້ອງສືບສວນຄົ້ນຄ້ວວ່າມີໃຜແດ່ຖືກແມ່ພະຍາດຕິດລະບາດມາ ພ້ອມທັງ ພະຍາຍາມແຈກ

ຢາຕ້ານເຊື້ອໂຮກແກ່ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ທັນການ.

ມີການທົດສອບ ໂຮກ "ແອນແທຣດ" ຫລື ການຕິດລະບາດກັບ "ແອນແທຣດ" ບໍ່?

ພະຍາດ "ແອນແທຣດ" ຫາກລະບົບຫາຍໃຈ, ຕາມຫັນຕາແລ້ວກວດພົບໄດ້ ໂດຍກວດແມ່ພະຍາດ "ແອນແທຣດ" ຢູ່ໃນເລືອດ, ຫລືຢູ່ນ້ຳນ້ຳທີ່ໄຫລອອກມາຈາກປອດ ຫລືຊ່ອງຫາຍໃຈ. ພະຍາດ "ແອນແທຣດ" ຫາກຜິວໜັງ ກວດພົບໄດ້ຍ້ອນການທົດສອບ ຫລືກວດເບິ່ງຜິວໜັງ.

ບໍ່ມີການກວດວິຈັຍໃດໆ ທີ່ຈະບອກໃຫ້ໄດ້ວ່າທ່ານໄດ້ຕິດແມ່ພະຍາດ "ແອນແທຣດ" ແລ້ວ.

ຂ້ອຍຈະເຮັດຢ່າງໃດ ຖ້າຂ້ອຍຄິດວ່າຕິດ "ແອນແທຣດ" ແລ້ວ?

ຖ້າທ່ານພົບເຫັນເຫດການທີ່ໜ້າສົງໄສ ຫລືເຫັນການເຄື່ອນໄຫວຂອງບຸກຄົນທີ່ຢູ່ໃນເຂດຄຸ້ມວົງສັງຄົມຂອງທ່ານ, ລວມທັງເຊັ່ນ ຄິດວ່າເຂົາອາດຈະມີການຜະລິດເຊື້ອໂຮກເພື່ອຈະນຳໄປໃຊ້ແທນເປັນອາວຸດ, ໃຫ້ແຈ້ງກັບເຈົ້າໜ້າຕຳຮອດໃນທ້ອງທີ່ຂອງທ່ານທັນທີ.

ຈະບໍ່ມີທາງຮູ້ໄດ້ຢ່າງໝັ້ນໃຈ ຖ້າວ່າທ່ານໄດ້ຕິດເຊື້ອ ແອນແທຣດແລ້ວ ແຕ່ຖ້າທ່ານຄິດວ່າຕົນເອງຕິດເຊື້ອ "ແອນແທຣດ" ແລ້ວຫຼືມີຄວາມເປັນຫວ່ງເປັນໃຍນຳເຮືອງສຸຂະພາບຂອງທ່ານ. ທ່ານຕ້ອງໄປຫາໝໍຜູ້ປະຈຳຕົວຂອງທ່ານທັນທີ.

ຖ້າທ່ານມີຄວາມກັງວົນຫຼືໂສກເສົ້າກັບເຮືອງການໃຊ້ເຊື້ອໂຮກເປັນອາວຸດເພື່ອທຳການກໍ່ການຮ້າຍນັ້ນ, ທ່ານຄວນຈະໄປພົບທ່ານໝໍຝ່າຍໂຮກຈິດ.