

# Лечение латентного туберкулеза изониазидом и рифапентином (INH-RPT)

По результатам ваших анализов было выявлено, что у вас латентная форма туберкулеза. Это значит, что микобактерии туберкулеза попали в ваш организм и могут привести к возникновению болезни.

Микобактерии туберкулеза не причиняют вам вреда и не могут передаваться другим людям. Они как будто спят. Если они проснутся, вы можете заболеть. Такое состояние называется активной формой туберкулеза. Если у вас активная форма туберкулеза, вы можете заразить других людей.

## Как предотвратить развитие активной формы туберкулеза?

Чтобы предотвратить развитие активной формы туберкулеза, вы можете принимать лекарства. Для лечения латентного туберкулеза используют вместе препараты изониазид и рифапентин (INH-RPT). Они уничтожают спящие микобактерии до того, как те спровоцируют заболевание. Микобактерии туберкулеза очень стойкие. Чтобы их убить, может потребоваться несколько месяцев.

Вы будете встречаться со своим лечащим врачом или медсестрой раз в неделю в течение 12 недель для получения и приема изониазида и рифапентина. Препараты лучше всего принимать отдельно от приема пищи. Если желудок плохо реагирует на лекарства, можно принимать их с небольшим количеством пищи.

## Зачем мне принимать лекарства, если я не болею?

Спящие микобактерии туберкулеза убить гораздо проще, чем когда они проснутся и вы заболите.

## Что если я не буду принимать препараты?

Если вы не будете принимать изониазид и рифапентин, пропустите слишком много дней или прекратите принимать их до того, как ваш врач или медсестра разрешат вам, вы можете заболеть активной формой туберкулеза. Важно уничтожить микобактерии туберкулеза, чтобы и вы и ваша семья были здоровы.

## А если у меня есть прививка БЦЖ?

БЦЖ защищает детей от тяжелых форм туберкулеза, но только в течение нескольких лет. Она не может защитить от латентного туберкулеза или развития активной формы туберкулеза. Если у вас есть БЦЖ, вам все равно необходимо принимать лекарства от латентного туберкулеза, чтобы защитить себя и других.

## Что если я не могу оплатить стоимость изониазида и рифапентина?

Попросите у своего лечащего врача или медсестры бесплатные лекарства от туберкулеза, которые предоставляет департамент здравоохранения штата Миннесота в рамках программы борьбы с туберкулезом.

## Что если мне будет нужно переехать?

Сообщите своему лечащему врачу или медсестре, что вы собираетесь переехать в другой штат или город. Они помогут вам продолжить прием препаратов после переезда.

## Что мне следует знать о препаратах от латентного туберкулеза?

- Не пейте пиво, вино или другой спиртной напиток, пока не закончите лечение. Употребление алкоголя при приеме препаратов от латентного туберкулеза может навредить вашей печени.
- Сообщите своему лечащему врачу о других лекарствах, которые вы принимаете.
- Избегайте беременности в период приема изониазида и рифапентина. В случае наступления беременности сразу же сообщите об этом своему лечащему врачу или медсестре.

**Большинство людей принимают изониазид и рифапентин без каких-либо проблем. У некоторых проявляются побочные эффекты, например:**

- лихорадка в течение 3 дней и более;
- плохой аппетит или чувство усталости;
- расстройство желудка или тошнота;
- боль в животе;
- потемнение мочи (приобретает цвет чая или кофе);
- пожелтение кожи или глаз;
- кожная сыпь или зуд;
- онемение или покалывание в конечностях.

**Если у вас возникли какие-либо из этих симптомов:**

1. Прекратите прием лекарств.
2. Вызовите своего лечащего врача или медсестру. Не ждите следующего приема у врача.



**Принимайте лекарство** по рекомендации вашего лечащего врача или медсестры. Если вы пропустите прием лекарств в течение слишком длительного времени, лечение может быть неэффективным.

**Приходите на все приемы.** Ваш лечащий врач или медсестра проследят, чтобы ваше лечение было правильным.

Следующий прием у врача:

Дата:

Время:

Врач или медсестра:

Место приема:

Телефон:



Minnesota Department of Health  
Tuberculosis (TB) Prevention and Control Program  
P.O. Box 64975, St. Paul, MN 55164-0975  
651-201-5414  
[www.health.state.mn.us/tb](http://www.health.state.mn.us/tb)