

# የድብቅ ነቀርሳ በሽታ ሕክምና


የተደረገልዎት ምርመራ ድብቅ ነቀርሳ ወይም “LTBI” እንዳለብዎት ያሳያል። ጥቂት የነቀርሳ ጀርምቶች በብዙ የሰውነትዎ ክፍሎች ተሰራጭተዋል (ለምሳሌ በሳምባ፣ አጥገት ወይም በኩላሊት)።

የነቀርሳ ጀርምቶቹ አሁን እየጎድዎት አይደሉም። በአሁኑ ጊዜ ጀርምቶቹ “ተኛተዋል” ሆኖም ሕይወት አላቸው። ሰውነትዎ መከላከል አስከቻለ ድረስ እነዚህ ጀርምቶች እንደተኛ ይቆያሉ። ድብቅ ነቀርሳ ሲኖርዎት ለሌላ ሰው ነቀርሳ ሊያጋቡ አይችሉም።

ሰውነትዎ መከላከል ሲያቆም የነቀርሳ ጀርምቶቹ ይነቁና ማደግ ይጀምራሉ። ይህ ማገም ድብቅ ነቀርሳ ያለበት ሰው ላይ ሊደርስ የሚችል ነው። ጀርምቶቹ አድገው መስራጨት ሲጀምሩ ገቁ ነቀርሳ በሽታ ተፈጠረ ማለት ነው። ገቁ ነቀርሳ በሽታ ያላቸው ሰዎች በጣም ሊታመሙና ለሌሎች ሰዎች ነቀርሳ ሊያጋቡ ይችላሉ።

## የሳገባ ነቀርሳ በሽታ ለመከላከል ምን ማድረግ እችላለሁ?

ገቁ ነቀርሳ በሽታ እንዳይዘዎት ለመከላከል መውሰድ የሚችሉት መድሃኒቶች አሉ። አይሰናዩዝድ (Isoniazid ወይም INH) ለ ድብቅ ነቀርሳ ማከሚያ የተለመደ መድሃኒት ነው። INH “የተኛትገ” የነቀርሳ ጀርምቶች



ከመታመም በፊት ይገለቸዋል። የነቀርሳ ጀርምቶችም ሃይለኛ ስለሆኑ መድሃኒቱ እስከሚገላቸው ብዙ ወራት ይፈጃል።

INH በደንብ የሚሰራው ዶክተርዎ ማቆም ይችላሉ እስከሚልዎት ድረስ በየቀኑ ሲወሰዱት ነው። የ INH መድሃኒትዎን ያለ ምግብ ይውሰዱት።

ሕክምናዎ በደንብ እየተካሄደ መሆኑን ለማረጋገጥ፣ የINH መድሃኒት በሚወሰዱበት ጊዜ ዶክተርዎ ጋር በወር አንድ ጊዜ መሄድ አለብዎት።

## ሕመም ካልተሰማኝ ለምንድነው መድሃኒት መውሰድ ያለብኝ?

INH የነቀርሳ ጀርምቶችን የሚገድለው ነቅተው ከማሳመማቸው በፊት ነው። የነቀርሳ ጀርምቶች እንቅልፍ ላይ እንዳሉ ለመግደል እንደሚቀል ያስታውሱ።

## ስለ ድብቅ ነቀርሳ መድሃኒት ምን ማወቅ አለብኝ?

ብዙ ሰዎች ያለ ምንም ችግር በየቀኑ INH ይወስዳሉ፤ ሆኖም የሚከተሉትን ነገሮች መከታተል ይኖርብዎታል፦

- ከሦስት ቀን በላይ የሚቆይ ትኩሳት
- የምግብ ፍላጎት አነስተኛ ሲሆን፣ የሰውነት ክብደት ሲቀንስ ወይም ያለ ምክንያት የድካም ስሜት ሲሰማ
- ማቅለሽለሽ ወይም ማስታወክ
  - አንዳንድ ሰዎች የINH ኪኒን መውሰድ ሲጀምሩ የማቅለሽለሽ ስሜት ያደርባቸዋል። ይህ ከተሰማዎት ከኪኒንም ጋር መጠኑ አነስ ያለ ምግብ ለመብላት ይሞክሩ። ወይም ኪኒንን ከመኝታ በፊት ይውሰዱት። የማቅለሽለሽ ስሜቱ ከሦስት ቀን በላይ ከቆየ ክሊኒክም ጋር ወዲያው ይደውሉ።
- የሆድ ሕመም
- ጠቆር ያለ ሽገት (የሻይ ወይም የቡና ቀለም)
- ቢጫ ቆዳ ወይም ዓይን
- የቆዳ ሽፍታ ወይም ማሳከክ
- እጅ ወይም እግር ላይ የመደገዝዝ ወይም የመነዝነዝ ስሜት
- ከሦስት ሳምንት በላይ የሚቆይ ሳል
- ማታ ማታ ላብ

ከነዚህ ችግሮች ውስጥ አንዱ ካልዎት ክሊኒክም ጋር ወዲያው ይደውሉ - እስከሚቀጥለው ቀጠርዎ ድረስ አይጠብቁ።

## ሌሎች አስፈላጊ ነጥቦች:

- INH በሚወሰዱበት ጊዜ አልኮል መጠጣት ጉበትዎን ሊጎዳው ይችላል። የድብቅ ነቀርሳ ሕክምናዎን እስከሚጨርሱ ድረስ ቢራ፣ ወይን ወይም ሌላ አልኮል መጠጥ አይጠጡ።
- ሌላ ዓይነት መድሃኒት እየወሰዱ ከሆነ ወይም ነፍሰ ጡር ከሆኑ ለዶክተርዎ ወዲያው ያስታውቁ።



# የድብቅ ነቀርሳ በሽታ ሕክምና - ገጽ 2

## መድሃኒቱን ባልወሰድ ምን ይሆናል?

INH ባይወሰዱ ወይም ኪኒን ሳይጨርሱ ቶሎ ቢያቆሙ የገቁ ነቀርሳ በሽታ ሊነሳብዎት ይችላል። ይህ ማግኛውም ድብቅ ነቀርሳ ያለው ሰው ላይ በማግኛውም ጊዜ ሊከሰት ይችላል። ይህ እርስዎ ላይ ወይም ቤተሰብዎ ላይ እስከሚደርስ አይጠብቁ!

## የ ቢሲጂ ክትባት ካለኝ ምን ማድረግ አለብኝ?

የነቀርሳ በሽታ በተለመደባቸው አገሮች ውስጥ ብዙ ሰዎች ቢሲጂ የሚባል ክትባት ወስደዋል። ቢሲጂ ልጆችን ከነቀርሳ መከላከል ቢችልም ለተወሰነ ዓመታት ብቻ ነው የሚቆየው።

ቢሲጂ የተከተቡ ሰዎች ነቀርሳ ሊይዛቸው ይችላል! ቢሲጂ ወስደው ከሆነ የድብቅ ነቀርሳ መድሃኒት በመውሰድ ራስዎን መከላከል ይችላሉ።

## ለኪኒኖቹ መክፈያ ገንዘብ ባይኖረኝስ?

ዶክተርዎን ወይም ነርስዎን ነፃ የነቀርሳ መድሃኒት እንዴት ማግኘት እንደሚችሉ ይጠይቁ።

## ቤት/ቦታ ለቅቄ ወደ ሌላ ቤት/ቦታ ብሄድስ?

ወደ ሌላ ሰቴት ወይም ከተማ ከለቀቁ ሕክምና የሚያገኙበትን ቦታ ከመሄድዎ አስቀድመው ይገገርዎቸዋል። የነቀርሳ መድሃኒትዎ ከለቀቁም በኋላ እንደሚደርስዎ ማረጋገጥ ይችላሉ።

**እራስዎን፣ ቤተሰብዎንና ጓደኞችዎን ከነቀርሳ ይከላከሉ - የነቀርሳ መድሃኒትዎን በሙሉ ይውሰዱ!**

**የነቀርሳ መድሃኒቱን እንደወሰድ እንዴት ማስታወስ እችላለሁ?**

የነቀርሳ መድሃኒትዎን በየቀኑ መውሰድ አለብዎት። ሳይወሰዱ ብዙ ቀኖች ካላለፉ መድሃኒቱ ላይሠራ ይችላል። ዶክተርዎ ማቆም ይችላሉ እስከሚልዎት ድረስ መውሰድዎን ይቀጥሉ።

ለማስታወስ ሊረዳዎት የሚችሉ አገዳገድ መገገዶች፦

- ኪኒኖችዎን በየቀኑ ፊት ለፊት ሊያይዩቸው የሚችሉት ቦታ ላይ ያስቀምጧቸው
- ቤተሰብ ወይም ጓደኛ በየቀኑ እንዲያስታውሱት ይጠይቁ
- ካሌንደርዎ ላይ መድሃኒት በወሰዱ ቁጥር በየቀኑ ምልክት ያድርጉ
- የኪኒን ማስታወሻ ሳጥን ይጠቀሙ
- ኪኒንዎትን ሲወሰዱ በየቀኑ አገድ ዓይነት ሰዓት ላይ ይውሰዱ። ለምሳሌ ጥርስዎን ከተረሸ በኋላ፣ ቁርስ ከበሉ በኋላ ወይም ልክ ከመተኛትዎ በፊት

ሳይወሰዱ የረሱት ቀኖች ካሉ ይጻፏቸውና በሚቀጥለው ጊዜ ዶክተርዎን ወይም ነርስዎን ይገገሯቸዋል።

## ዶክተርዎ/ክሊኒክዎ/ነርስዎ:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## ስልክ ቁጥር: \_\_\_\_\_



Tuberculosis Prevention and Control Program  
P.O. Box 64975  
St. Paul, MN 55164-0975  
651-201-5414  
1-877-676-5414  
[www.health.state.mn.us/tb](http://www.health.state.mn.us/tb)